

# Betadine®

## Zalf

### Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Betadine zalf zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### In deze bijsluiter:

1. Wat is Betadine zalf en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Betadine zalf gebruikt.
3. Hoe wordt Betadine zalf gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Betadine zalf?
6. Aanvullende informatie.

#### 1. Wat is Betadine zalf en waarvoor wordt het gebruikt?

Betadine zalf is een desinfectans (ziektekiemdodend middel), waarvan het werkzame bestanddeel, povidonjood, een snelle en lang aanhoudende micro-organismedodende (doden van uitsluitend microscopisch waarneembare organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen) werking heeft.

Betadine zalf wordt gebruikt voor het behandelen en voorkomen van infecties van de beschadigde huid en bij brandwonden.

#### 2. Wat u moet weten voordat u Betadine zalf gebruikt.

##### **Gebruik Betadine zalf niet**

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor povidonjood of voor één van de andere bestanddelen van Betadine zalf.
- op grote huidoppervlakken wanneer u last heeft van een overmatige schildklierwerking.

##### **Wees extra voorzichtig met Betadine zalf**

- bij jodiumovergevoeligheid
- bij schildklierafwijkingen
- niet te gebruiken ter voorkoming van tetanus

##### **Inname in combinatie met andere geneesmiddelen**

Er zijn geen specifieke gevallen van wisselwerking van Betadine zalf met andere (genees)middelen bekend.

##### **Zwangerschap en borstvoeding**

Langdurige toepassing op grote oppervlakken slechts na overleg met de arts. Povidonjood kan worden uitgescheiden in de moedermelk. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

##### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.

#### 3. Hoe wordt Betadine zalf gebruikt?

Na plaatselijke wondverzorging direct dun op de wond aanbrengen. Betadine zalf kan zonder bezwaar met verband worden afgedekt. Verband wisselen en opnieuw Betadine zalf aanbrengen zolang de wond nog niet dicht, in principe dagelijks of om de dag.



De werking van Betadine zalf berust op geleidelijk uit deze verbinding vrijkomend jodium dat geen pijn veroorzaakt bij contact met de huid. Door de bruine kleur, die duidt op de aanwezigheid van jodium, is de plaats zichtbaar waar gedesinfecteerd is. De desinfecterende werking van Betadine duurt voort zolang de bruine kleur zichtbaar is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

#### **Wat u moet doen als u meer van Betadine zalf heeft gebruikt dan u zou mogen.**

Mocht een persoon onverhoopt grote hoeveelheden Betadine zalf via de mond hebben binnengekregen, dan moet die persoon veel water of melk drinken en eventueel een middel gebruiken dat de stoelgang bevordert.

Mocht een persoon onverhoopt zeer grote hoeveelheden Betadine zalf hebben aangebracht, dan moet het gebied goed worden uitgewassen.

#### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Betadine zalf te gebruiken.**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wanneer u bent vergeten Betadine zalf te gebruiken doe dit dan alsnog zodra u het zich herinnert.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Betadine zalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen bij gebruik van Betadine zalf voorkomen.

- In enkele gevallen komt huidirritatie voor.
- Zelden (meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1 op de 1000 personen) veroorzaakt povidonjood bij patiënten met een bekende jodiumovergevoeligheid huidirritaties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### 5. Hoe bewaart u Betadine zalf?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

De tube zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik Betadine zalf niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tube na EXP.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

#### 6. Aanvullende informatie

##### **Wat bevat Betadine zalf?**

- Het werkzame bestanddeel is povidonjood. Eén gram Betadine zalf bevat 100 mg povidonjood.
- De andere bestanddelen zijn macrogol 400, macrogol 4000, macrogol 6000 en gezuiverd water

##### **Hoe ziet Betadine zalf er uit en de inhoud van de verpakking?**

Betadine zalf is een bruinrode zalf.

De zalf is verpakt in tubes van 4, 30, 50 en 100 gram.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten hoeven in de handel te worden gebracht

##### **Registratiehouder en Fabrikant**

## **MEDA**

Meda Pharma BV

Postbus 167, 1180 AD Amstelveen

Ingeschreven in het register onder RVG 01330

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2006