

Gebruiksaanwijzing Betadine Desinfectiepleisters

Betadine[®]

Desinfectiepleisters 100 mg/g povidonjood

Wondpleisters met Betadine[®] oplossing

Te gebruiken bij:

Het reinigen, behandelen of voorkomen van infecties van oppervlakkige brand-, snij-, of schaafwonden.

Niet te gebruiken bij:

- Pasgeborenen en te vroeg geboren
- Een overmatige schildklierwerking • Jodiumovergevoeligheid

Gebruiksaanwijzing:

- Wond reinigen • Huid droogdeppen voor een goede hechting
- Pleister direct op de wond aanbrengen
- Tenminste 1 x per dag pleister vernieuwen (vaker indien nodig)
- Betadine desinfectiepleisters niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen

Waarschuwing:

Op een donkere plaats, bij 15-25°C en buiten bereik van kinderen bewaren

Inhoud van de doos:

16 strips, 2 x 7 cm waterbestendige Betadine desinfectiepleisters. De pleister vermindert de kans op wondverontreiniging, geeft optimale vochtbalans door microporiën, weinig kans op huidirritatie en hecht zich niet aan de wond. De pleister is vuil- en waterafstotend en per stuk hygiënisch verpakt.

Registratiehouder:

Meda Pharma B.V., Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

MEDA